

COS'È FOTONA FracRevive®?

FracRevive® è un trattamento di ringiovanimento efficace e minimamente invasivo in due fasi, eseguito sia con un raggio laser completo che con un raggio laser Nd:YAG Q-switched frazionato. La terapia migliora l'aspetto e la consistenza della pelle, riduce le dimensioni dei pori, la pigmentazione e le rughe statiche. Viene utilizzata per ringiovanire e migliorare l'aspetto della pelle. L'intervento è sicuro anche per le carnagioni scure.

QUALE LASER UTILIZZIAMO?

Fotona Starwalker MaQX.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO?

La pelle viene pulita e gli occhi vengono protetti con occhiali laser. L'intervento laser si svolge in due fasi.

Nella prima fase, la pelle viene riscaldata con un fascio laser completo in modalità MaQX Nd:YAG, e nella seconda fase, viene utilizzata la tecnologia a freddo minimamente ablativa FracTAT®. Vengono eseguiti due passaggi, più altri due nelle aree con pori dilatati, pigmentazione e tono della pelle non uniforme. La terapia può essere ripetuta dopo quattro-sei settimane.

Durante l'intervento, nella prima parte si percepisce calore e nella seconda si udiranno onde fotoacustiche frazionate.

Dopo l'intervento, la pelle è arrossata e leggermente danneggiata, con possibile lieve sanguinamento, e guarisce entro cinque giorni.

QUANTE VOLTE È NECESSARIO RIPETERLO?

Per risultati ottimali, si consiglia un trattamento al mese, tre o quattro volte di seguito, poi una o tre volte all'anno per il mantenimento o singolarmente, a seconda delle condizioni della pelle.

SUCCESSO DELL'INTERVENTO

Il miglioramento dell'aspetto e della struttura della pelle è visibile già dopo un solo trattamento; per risultati ottimali si consigliano quattro trattamenti. Una volta ottenuto il miglioramento desiderato, il trattamento può essere ripetuto ogni quattro-sei mesi per mantenerlo.

CONTROINDICAZIONI, OVVERO CHI NON DOVREBBE SOTTOPORSI AL TRATTAMENTO?

Per donne in gravidanza e per chi è ipersensibile alla luce, ha un'infezione attiva sul viso o sta assumendo farmaci fototossici.

EFFETTI COLLATERALI E COMPLICAZIONI

Raramente possono verificarsi rossore e gonfiore dopo l'intervento, che generalmente si risolvono entro uno o due giorni. Molto raramente possono verificarsi disturbi della pigmentazione o infezioni, come focolai di herpes.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE DOPO IL TRATTAMENTO

Si consiglia di applicare una crema riparatrice più volte al giorno per contrastare la sensazione di secchezza della pelle e di proteggersi costantemente dal sole. Il primo giorno possono manifestarsi rossore, una leggera sensazione di bruciore e, molto raramente, gonfiore. Il secondo giorno compaiono delle piccole crosticine che cadranno dopo tre o quattro giorni.

In genere è possibile riprendere il lavoro o le attività quotidiane tra uno e cinque giorni dall'intervento.

Inoltre, prima dell'intervento, il paziente è tenuto a compilare insieme al medico un modulo di consenso o rifiuto delle cure mediche, in seguito ai chiarimenti in conformità con la Legge sui diritti del paziente e sul dovere di informazione del medico. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e la dichiarazione stessa verranno consegnate al momento dell'arrivo presso il nostro istituto.

SIETE PREGATI DI CONTATTARCI PER EVENTUALI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.

Ci prenderemo cura della vostra salute e del vostro benessere con il massimo impegno. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci.

Redatto da:

Janja Šmid Vauhnik, dott.ssa in medicina, specialista in dermatovenerologia