

COS'È LA REDERMALIZZAZIONE?

L'acido succinico e l'acido ialuronico vengono iniettati nella pelle, stimolando la rigenerazione cutanea e migliorandone la qualità; i segni dell'invecchiamento vengono attenuati, l'incarnato uniformato e il drenaggio linfatico accelerato.

La redermalizzazione agisce su tre livelli: aiuta a regolare i processi biochimici nelle cellule, mantiene l'equilibrio idrico e blocca attivamente i radicali liberi.

L'acido succinico normalizza la microcircolazione e accelera il drenaggio linfatico, inibendo l'azione dell'enzima tirosinasi e, di conseguenza, mantenendo un tono o un incarnato uniforme. L'acido ialuronico attiva i mediatori antinfiammatori, ripristina l'equilibrio idrico e contribuisce alla sintesi delle proteine strutturali di base, fornendo supporto meccanico ai tessuti.

L'intervento è adatto a persone con gonfiore del viso dovuto a scarso drenaggio linfatico, occhiaie, pelle stanca con rughe sottili e pelle soggetta a iperpigmentazione e acne, quando persistono macchie rosse e marroni e cicatrici.

Può essere utilizzato sulla pelle del viso, del collo e del décolleté.

QUALI PRODOTTI UTILIZZIAMO?

Vengono utilizzati prodotti fabbricati da Xela REDERM.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO?

Inizialmente, viene applicata una crema anestetica per rendere l'intervento più confortevole. In seguito, un prodotto dalla composizione appropriata viene iniettato nella pelle con un ago molto sottile, a seconda dell'indicazione. Dopo l'intervento, vengono applicati una maschera e un prodotto per la cura del corpo.

QUANTE VOLTE È NECESSARIO RIPETERLO?

L'intervento viene eseguito tre volte di seguito ogni due settimane, quindi il ciclo viene ripetuto dopo sei mesi.

SUCCESSO DELL'INTERVENTO

Già dopo il primo ciclo di iniezioni, la qualità e il tono della pelle migliorano. Dopo l'intervento, le occhiaie sono meno visibili, la pelle diventa più chiara di una o due tonalità e i segni di stanchezza scompaiono. Nel caso delle cicatrici da acne, queste sono meno profonde e le macchie sono più chiare.

CONTROINDICAZIONI OSSIA PER CHI NON È ADATTA LA PROCEDURA?

La procedura non deve essere eseguita su donne in gravidanza, madri che allattano, bambini e persone con epilessia non trattata, infiammazione cutanea cronica o acuta nel sito di iniezione, allergia nota a un componente del prodotto di redermalizzazione, gravi malattie organiche e sistemiche, comprese le malattie autoimmuni, persone soggette a formazione di cicatrici ipertrofiche e persone con disturbi della coagulazione del sangue o tendenza al sanguinamento. È richiesta particolare cautela per le persone che assumono farmaci anticoagulanti, poiché potrebbero verificarsi sanguinamenti o lividi nel sito dell'intervento. È necessario informare se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti.

EFFETTI COLLATERALI E COMPLICAZIONI

Per alcuni giorni, potrebbero comparire piccole protuberanze o linee nel sito di iniezione, che scompariranno spontaneamente. Potrebbero verificarsi lievi sanguinamenti e lividi temporanei.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE DOPO IL TRATTAMENTO

A casa, si utilizza un prodotto specifico tre volte al giorno, per poi passare ai cosmetici quotidiani. Eventuali lividi possono essere coperti con cipria il giorno dopo l'intervento. L'uso della sauna è sconsigliato per 14 giorni.

È possibile riprendere il lavoro o le attività quotidiane in uno o tre giorni.

Inoltre, prima dell'intervento, il paziente è tenuto a compilare insieme al medico un modulo di consenso o rifiuto delle cure mediche, in seguito ai chiarimenti in conformità con la Legge sui diritti del paziente e sul dovere di informazione del medico. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e la dichiarazione stessa verranno consegnate al momento dell'arrivo presso il nostro istituto.

SI PREGA DI CONTATTARCI SULLE PARTI NON CHIARE DEL PRESENTE TESTO E RICHIEDERE ULTERIORI SPIEGAZIONI.

Ci prenderemo cura della vostra salute e del vostro benessere con il massimo impegno. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci.

Preparato da:

Janja Šmid Vauhnik, dott.ssa in medicina, specialista in dermatovenerologia